

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Maxforce® Fly Bayt es insecticida nicotínico con cebo específico para moscas y un amargante, Bitrex, disuasivo para el consumo por humanos y animales domésticos, por lo que posee amplio margen de seguridad para el hombre y los animales domésticos, sin embargo es recomendable informar a las personas sobre el tipo de tratamiento aplicado y los lugares en los que fue colocado el producto. Al manipular este producto se deberá utilizar equipo de protección adecuada: Guantes, googles, mascarilla y overol y zapato cerrado.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

• "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO". • "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". • "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS". • "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS". • "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO". • "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN". • "NO DESTAPE LAS BOCUILLAS CON LA BOCA". • "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO". • "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO". • "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA". • "NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Consejo general: retirar a la persona de la zona de intoxicación. Quitarle inmediatamente la ropa contaminada. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable.

En caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua, en caso de irritación llamar al médico de inmediato. En caso de contacto con la piel lavar profusamente con agua y jabón, en caso de presentarse irritación y que esta persista, llamar al médico de inmediato. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo permite, enjuagar la boca y dar a ingerir un vaso con agua. Consultar al médico inmediatamente. No provocar el vómito.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

Insecticida del grupo químico de los clorocinotrilos. **Signos y síntomas de intoxicación:** en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tembor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. **Antídoto:** no existe antídoto específico. **Tratamiento:** sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos.

URGENCIAS

En caso de intoxicación llamar al SINTOX (24 horas, 365 días del año). Teléfonos **01 (55) 5598-6659, 01 (55) 5611-2634, 01800 0092800.**

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

• "Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos". • "Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley general para la prevención y gestión de los residuos, su Reglamento o al Plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT". • "En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano". • Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

"APLICACIÓN URBANA"

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

El uso de **Maxforce® Fly Bayt** es recomendado en esquemas de manejo integrado, en combinación con aspersiones residuales de insecticidas en las instalaciones. El manejo integrado reduce el riesgo de resistencia en la plaga.

Método de aplicación

Maxforce® Fly Bayt es un cebo muy versátil en su aplicación en diversas zonas o instalaciones urbanas, tales como: casas-habitación; edificios públicos: hospitales, hoteles, oficinas, escuelas, piscinas, guarderías, iglesias, cines, teatros, plantas industriales, laboratorios, almacenes; bodegas, basureros y otros depósitos de desechos urbanos; medios de transporte; terrazas, patios, entradas a casas; establecimientos donde se manejan o procesan alimentos: cocinas, restaurantes, cafeterías, panaderías, supermercados, mataderos, industria alimentaria, áreas y plantas procesadoras de alimentos en general y comúnmente en todos aquellos lugares urbanos donde las moscas habitan y se desarrollan.

PLAGAS	FORMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN	USOS
MOSCAS <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia</i> spp. y otras moscas urbanas	Esparcido Cubrir 200 m ² de superficie con 400 g de Maxforce® Fly Bayt .	Cubrir la superficie del piso con Maxforce® Fly Bayt , especialmente en áreas externas perimetrales de las instalaciones, con la finalidad de atraer al exterior a las moscas. Evite formar montículos. Puede esparcirse sobre papel engomado y colgar este en el exterior o partes superiores de instalaciones.
	Con brocha Formar una pasta mezclando 100 g de Maxforce® Fly Bayt en 80 mL de agua para tratar de 45 a 50 m ² . La pasta debe reposar de 1 a 2 h antes de la aplicación.	Aplicar sobre marcos de puertas, ventanas y accesos a instalaciones, columnas de soporte, trabes, vigas, postes y puntos estratégicos en el exterior de instalaciones.
	Aspersión Mezclar 200 g de Maxforce® Fly Bayt en 2000 mL de agua (1:10)	Utilizar boquilla de abanico plano 8002 u 8001 a baja presión. Asperjar sobre superficies: marcos de puertas, ventanas y accesos a instalaciones, columnas de soporte, trabes, vigas, postes y puntos estratégicos en el exterior de instalaciones.
	Colocar de 50 a 100 g de Maxforce® Fly Bayt en cajas, recipientes hondos o en su defecto, sobre papel engomado, a una altura de 1.5 a 2.5 m.	Uso en Interior de las instalaciones.

Frecuencia de aplicación: Vigilar a diario la dotación de cebo hasta observar reducción de los índices de población de moscas.

Producto autorizado para usarse en la industria alimentaria y áreas de proceso de alimentos.

Intervalo de aplicación: Aplicar durante la temporada de moscas.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: En virtud del tipo de aplicación focalizado el ingreso es inmediato.

Contraindicaciones: No se mezcle con otros plaguicidas. No aplicar otros insecticidas sobre el cebo **Maxforce® Fly Bayt**.

GARANTIA

Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad.



Maxforce

FLY BAYT

imidacloprid
INSECTICIDA, Cebo con atrayentes, clorocinotilino

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingrediente activo:

Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ildienamina 0.50

(Equivalente a 5 g de i.a./kg)

Ingredientes inertes:

Atrayentes, emulsificante, floculante, espesante, colorante, antioxidante, portadores, antiaglomerante y amargante. 99.50

TOTAL 100.00

RSCO-URB-INAC-199-327-349-0.5

Contenido neto: 350 g

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

No. de Lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro, importador y distribuidor: Bayer de México, S.A. de C.V.
Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F.
Servicio al Cliente 01 800 229 3727 www.saludambiental.com.mx
Planta y almacén: Vía Morelos No. 333-E, Sta. Clara Costilla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540

© Marca Registrada por Bayer

RFIC: BMR8205119J5

"HECHO EN HOLANDA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



PRECAUCIÓN

