



# “APLICACIÓN URBANA”

# Temprid<sup>®</sup> SC

Para recomendaciones de uso  
de prorroga aquí

## imidacloprid + betacyflutrín

### INSECTICIDA, suspensión concentrada, cloronicotínilo+piretroide

“Composición porcentual”

Ingrediente activo:	% en peso
<b>Imidacloprid:</b> (E)-1-[6-cloro-3-piridilmetil]-N-nitroimidazolidin-2-ílidenamina. (Equivalente a 241.5 g de i.a./L)	21.00
<b>Betacyflutrín:</b> (R)- $\alpha$ -ciano-4-fluoro-3-fenoxibencil (1S,3S)-3-[2,2-diclorovinil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-6 $\alpha$ -ciano-4-fluoro-3-fenoxibencil (1R, 3R)-[2,2-diclorovinil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 120.8 g de i.a./L)	10.50
<b>Ingredientes inertes:</b> Humectantes, anticongelante, antiespumante, espesante, conservador y disolvente.	68.50
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

RSCO-URB-MEZC-1101T-301-064-032

## Contenido neto: 240 mL



### Nocivo en caso de ingestión Nocivo si se inhala

MX300206506C

No de lote y Fecha de fabricación (año/mes/día): ver el cuerpo del envase

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

**Titular del registro, importador y distribuidor:** Bayer de México, S.A. de C.V.

Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada.

C.P. 11520, México, D.F. BajPremium Tel. 01 (55) 6728 3000, ext. 2729 y 2740,

Lada sin costo 01-800-229 3737 Fax: 01 (55) 5262 9527/(55) 5262 9528.

[www.saludambiental.com.mx](http://www.saludambiental.com.mx)

**Planta y almacén:** Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatlilla, Ecatepec de Morelos,

Edo. de México. C.P. 55540 © Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

“HECHO EN E.U.A.”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS  
POR LA SECRETARÍA DE SALUD”



# PRECAUCIÓN



**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”**

## **“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**

### **“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”**

Durante el manejo y aplicación de **Temprid® SC** se deberá utilizar ropa protectora: Overol, guantes resistentes a químicos, botas, lentes de seguridad con protección lateral.

### **“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”**

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZADO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESE PRODUCTO”.

- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**

**“PRIMEROS AUXILIOS”**

En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel, quite la ropa impregnada y lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo permite, dar a ingerir un vaso con agua. No provocar el vómito. Consúltese al médico inmediatamente. En caso de inhalación, lleve al paciente a un lugar ventilado, abriguelo y recuéstelo. Si está inconsciente no administre nada por la boca, vigile que respire sin dificultad y llame a un médico de inmediato.

**“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”**

Insecticida del grupo químico de los cloronicotinilos y piretroides. **Signos y síntomas de intoxicación:** En caso de contacto con la piel u ojos puede presentarse una irritación ligera en personas sensibles. En caso de exposición

o ingestión de grandes dosis pueden presentarse vómito, cefalea, manifestaciones nerviosas moderadas, impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. **Tratamiento:** sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos. **Antídoto:** no existe antídoto específico.

**URGENCIAS:** En caso de intoxicación llamar al **SINTOX** (24 horas, 365 días del año). Teléfonos **01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01800 0092800.**

#### **“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”**

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, su reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

- “En caso de derrames se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.
- Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

#### **GARANTIA**

**Bayer de México, S.A. de C.V.** garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posterior a la comercialización o la aplicación del producto. Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

## “INSTRUCCIONES DE USO”

### “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

#### Información general

**Temprid® SC** es un insecticida de amplio espectro formulado a base de dos activos: Imidacloprid y Betacyflutrin, lo que le provee un doble modo de acción: por contacto y sistémico, potencializando su efectividad. Su novedosa mezcla de activos, proporciona un derribo rápido y control residual efectivo. Está recomendado tanto para tratamientos en interiores como para tratamientos perimetrales en exteriores.

**Temprid® SC** puede aplicarse en cualquiera de las siguientes zonas o instalaciones urbanas: casas-habitación; edificios públicos: hospitales, hoteles, oficinas, escuelas, guarderías, iglesias, cines, teatros, plantas industriales, laboratorios, almacenes; bodegas, basureros y otros depósitos de desechos urbanos; medios de transporte; establecimientos donde se manejan o procesan alimentos: restaurantes, cafeterías, panaderías, supermercados y plantas procesadoras de alimentos en general.

Los tratamientos podrán ser tanto en interiores como en exteriores (perimetrales).

## Plagas control (interiores y exteriores)

PLAGAS	
Mosquitos	<i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp. <i>Culex</i> spp.
Cucarachas	<i>Blatella germanica</i> , <i>Periplaneta</i> spp., <i>Blatta orientalis</i>
Moscas	<i>Simulium</i> spp., <i>Musca domestica</i> , <i>Fania</i> spp.
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharina</i>
Grillos	<i>Acheta domesticus</i>
Cochinillas	Crustacea. Isopoda
Polilla de la ropa	<i>Tineola</i> sp., <i>Trichophaga</i> sp.
Catarinas	<i>Coccinella septempunctata</i> , <i>Hippodamia convergens</i>
Chinches de árbol	<i>Boisea rubrolineata</i>
Avispas amarillas	<i>Paravespula</i> sp.
Hormigas	<i>Tetramorium caespitum</i> , <i>Pheidole</i> spp., <i>Camponotus</i> spp., <i>Solenopsis</i> spp., <i>Monomorium minimum</i>
Hormiga carpintera	<i>Camponotus</i> spp.

## PLAGAS

Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> , <i>Loxosceles reclusa</i> , <i>Lycosa</i> spp.
Escarabajos de textiles	<i>Anthrenus</i> sp.
Ácaro araña	<i>Bryobia praetiosa</i>
Cienpiés, Milpiés	<i>Scolopendra</i> sp., <i>Scutigera coleoptera</i>
Escarabajo de las pieles	<i>Dermestes maculatus</i>
Jejenes (Chaquistes)	<i>Culicoides</i> spp.
Escarabajo negro	<i>Alphitobius diaperinus</i>
Palomillas	Noctuide, Geometridae
Tijerillas	<i>Forfiluca</i> spp.
Pulgones	Aphididae
Chinche de cama	<i>Cimex lectularius</i>

**Dosis :** 2.0 – 4.0 mL de **Temprid® SC** / L de agua; 1 L de esta mezcla rinde para tratar 20 m<sup>2</sup> de superficie.

Utilice la dosis mayor en caso de infestaciones severas, o cuando requiera un derribo más rápido o mayor efecto residual. **Temprid® SC** puede proporcionarle hasta 4 semanas de control.



## **Instrucciones de aplicación**

La aplicación debe realizarse por aspersión: Utilice aspersor de baja presión (no exceder los 50 psi en la punta de la boquilla).

### **Aplicación en interiores**

Aplicar en los puntos de entrada: alrededor de las tuberías, puertas y ventanas, así como, debajo de refrigeradores, lavabos, gabinetes y estufas, prestando especial atención en las grietas y hendiduras.

Aplicar debajo de los muebles, en clóset y áreas de almacenamiento, pero nunca aplicar en todo el piso. También aplicar en las áreas donde normalmente se alimenta a las mascotas.

Aplicar en los lugares por donde transitan las hormigas: en las paredes, azulejos, zoclos, alrededor de las tuberías, debajo de gabinetes, y otros lugares donde las hormigas están activas.

### **Aplicación en exteriores: Tratamiento perimetral**

Aplicar sobre las superficies de las construcciones, patios y otras estructuras, alrededor de puertas y ventanas, aleros y en aquellos lugares que pueden ser entrada de las plagas o donde se les haya observado. Como tratamiento preventivo, tratar las paredes del exterior de la estructura hasta una altura de medio a un metro, así como el suelo alrededor de esta.

### **Frecuencia de aplicación**

Dependiendo del grado de infestación y en caso de ser necesario se recomienda aplicar a intervalos de 7 a 10 días.

### **Tiempo de reentrada a los lugares tratados**

El reingreso está permitido una vez que se hayan secado completamente las áreas y superficies tratadas.

### **Contraindicaciones**

Para las aplicaciones en interiores, observar las siguientes medidas:

Durante el tratamiento se deberá asegurar que la gente y animales domésticos permanezcan fuera de las áreas de aplicación.

No aplicar como "aspersión espacial".

Durante la aplicación se deberán cubrir los utensilios de cocina y las superficies donde se procesen alimentos o deberán enjuagarse con agua después del tratamiento. Asimismo, los alimentos deberán retirarse del área de tratamiento.