

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (overol impermeable, guantes de PVC, goggles, mascarilla contra polvo o mascarilla completa con cartucho respiratorio). Mantenga el producto bien tapado en su empaque original. No use el producto en corrientes de agua.

- "PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"**
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO.
  - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, O FORRALES.
  - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.
  - AVÉSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
  - NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
  - NO ALMACENAR EN CASAS HABITADAS.
  - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
  - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
  - NO SE INCIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

**"PRIMEROS AUXILIOS"**

Si ha habido contacto con la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, con supervisión médica siempre que sea posible, induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia).

**"RECOMENDACIONES AL MEDICO"**

Grupo químico del producto: Derivado Oumarínico.

Antídoto: Administrar vitamina K<sub>1</sub>.

**Tratamiento específico:** Administrar Vitamina K<sub>1</sub>. Dosis adultos: 40 mg/día en varias tomas. Dosis niños: 20 mg/día en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protrombina y niveles de hemoglobina. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y queden normales y la hemorragia haya cesado.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Al ser ingerido por seres humanos puede provocar diarrea y hemorragia por nariz y encías.

**"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE"**

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAVALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGISTRO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."


"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PENETRABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECAPIPAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCAÑO."



**"APLICACIÓN URBANA"**

**UNIVAR**



Bromadiolona  
 Rodenticida / Bloque parafinado  
**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

**INGREDIENTE ACTIVO:**  
 Bromadiolona: 3-[β-(4'-Bromo-1'-bifenil)-4-yl]-3-hidroxi-1-fenil-propil-4-hidroxi-2H-1-benzotriazin-2-ona (Ecuivalente a 0.05 g de 1,2 kg.)

**INGREDIENTES INERTES:**  
 Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado alimenticio, parafina, colorante azul.

No. de Registro: RSCO-URB-RDDE-511-308-033-0.005

**CONTENIDO NETO: 8 kg**



NO CIVO EN CASO DE INGESTION  
 NO CIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

Importado y distribuido por:  
**SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.**

Amsterdam No. 143  
 Col. Hipódromo Condessa  
 06100 México, D.F.  
 Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8893  
 www.univarasmexico.com



Formulado Por:  
 3699 Kinsman Blvd.  
 Meisun, WI 53704, U.S.A.  
 www.belllabs.com

**PRECAUCIÓN**



**"INSTRUCCIONES DE USO"**

CONTRAC BLOX es un rodenticida de acción anticoagulante. Utilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

| PLAGA           | GRADO DE INFESTACIÓN | NO. DE BLOQUES / PUNTO DE CEBADO | OBSERVACIONES   |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|---|
| Ratas           | LIGERA A MODERADA    | 1 a 3                            | Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado o directo a madriguera cada 5 a 10 m |
| Rata Nutuega    | SEVERA               | 4 a 8                            | Colóquese la cantidad de cebo indicada cerca del rido o cada 3 a 4 metros de distancia.         |
| RATONES         |                      |                                  |   |
| Ratón doméstico |                      | 1                                |   |

Metodos para preparar y aplicar el producto

Determinese los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo, dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, nichos y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspecciónese las áreas tratadas al tercer día repólgase el cebo durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones. Posteriormente replácese el tratamiento a intervalos semanales, hasta que disminuya el consumo de cebo o se detecte la disminución de daños para prevenir reinfestaciones establezcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación replácese el tratamiento.

El uso de cebaderos herméticos de la línea Protecta® incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. Donde se replazan y repólgase el cebo cada vez que sea necesario. Inscríbase sobre los cebaderos la leyenda: PRECAUCIÓN RODENTICIDA.

Frecuencia de aplicación: Repetir la aplicación en caso de reinfestación.

**CONTRANDICACIONES**  
 Este producto es un cebo de aplicación directa. Manéjese los cebos con guantes. No se deben mezclar con insecticidas o ningún otro producto, para evitar el rechazo de cebo por los roedores.

**"GABARANTIA"**  
**SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.A. DE C. V.** garantiza el contenido de este empaque conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, si CONTRAC® y BLOX™ son marcas de Bell Laboratories, Inc. Estados Unidos.

Lote No.:

021114/01-14

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación



Product Code: 05130

\*USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD\*