



“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Debe evitar la inhalación, ingestión y contacto con la piel y ojos, con este producto.
“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”.

“NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”,
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE”, “EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”

Condiciones de manejo, almacenamiento y transporte:

Fendona® 6 SC no requiere de medidas especiales si se almacena y maneja correctamente. Almacéñese el producto en lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, ventilado, protegido de luz solar, alejado del calor y humedad, lejos de alimento para animales, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Manténgase el producto en su envase original.

Al manipular el insecticida recomendamos el uso de guantes de plástico y lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el producto.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.

El ingrediente activo de **Fendona® 6 SC** (alfacipermetrina) pertenece al grupo químico de los piretroides.

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Proporcione atención médica.

En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos; y proporcionar atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

En caso de ingestión: Enjuague inmediatamente la boca y beber posteriormente suficiente agua. No induzca al vómito a menos que indique el médico. Nunca induzca el vómito ni administrar nada por boca si la víctima está inconsciente o padece convulsiones

“ALEJE A LA PERSONA DEL AREA”.

“EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA”.

Antídoto: No se conoce antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”.

LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) AL
TEL. 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 00 las 24 horas del día.

Garantía: Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o cualquier otra ley relacionada y validado por ensayos de campo se ha demostrado que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual de la etiqueta y se hace responsable sólo respecto de la calidad constante del producto. Dado que el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.



“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



Fendona 6 SC

Insecticida / Suspensión Concentrada
“USO DOMESTICO”

INGREDIENTE ACTIVO	% en peso
Alfacipermetrina.....	5.83 %
(Equivalente a 60 gr de i.a. / L a 20°C)	
INGREDIENTES INERTES	
Espesante (thickener), anticongelante, preservativo, estabilizador químico, QSV, diluyente	94.17 %
TOTAL	100.00 %

REG. RSCO-DOM-INAC-107-308-064-06

CONTENIDO NETO: **1L**

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES
C.P. 03710 MÉXICO, D.F.
Tel: 01 (55) 5325-2600

“HECHO EN BRASIL”
BASF S.A.: Av. Brasil, 791
SP 12521-900
Guaratinguetá - Brasil

® Marca Registrada de **BASF**

Instrucciones de uso:

Fendona® 6 SC puede usarse en; casas, edificios públicos como hospitales, cocinas, restaurantes, hoteles, instalaciones industriales e instalaciones de proceso de alimentos y, en general todas las zonas urbanas.

Fendona® 6 SC es un insecticida piretroide de acción residual para el control de plagas urbanas y domésticas:

Insectos voladores: Para moscas, mosquitos, polillas, aplicar sobre la superficie donde los insectos se posan.

Hormigas: Aplicar alrededor de los nidos y a lo largo de sus vías de paso. Aplicar en franjas como barrera en los lugares de entrada.

Chinches: Aplicar en el armazón de las camas y a su alrededor en el suelo, muros y mobiliario especialmente a las grietas y hendiduras.

Pulgas: Aplicar alrededor de descanso de los animales.

Cucarachas e insectos rastroso: Incluyendo pececillos de plata, escarabajos, cochinillas de humedad, tijerillas; aplicar alrededor de los conductos de servicios, detrás y debajo de cocinas, frigoríficos y mobiliario. Prestar particular atención a grietas y hendiduras. Si los insectos entran del exterior, pulverizar en bandas formando barreras de 10 cm de anchura en puertas, ventanas.

Dosis: La dosis para un tratamiento normal a plagas sobre superficies o en vuelo será de 25 mL / 5 L. de agua aplicados sobre 100 m².

En condiciones extremas donde se necesita una acción residual especial o que las superficies estén sucias o sean altamente absorbentes, usar 50 mL / 5 L de agua para 100 m².

Puede ser nocivo en caso de ingestión

Puede ser nocivo por el contacto con la piel

LOTE n°:

FECHA FAB.:

FECHA CAD.: 2 años después de su fabricación

SAPB1083734 - REV01 - NOV14

Precaución