“APLICACIÓN URBANA”

Ficam® *W*

bendiocarb
INSECTICIDA, polvo humectable, carbamato

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	**% en peso**
Bendiocarb: 2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il metilcarbamato.	80.0
(Equivalente a 800 g de i.a./Kg)	
Ingredientes inertes:	
Dispersante, humectante y portador.	20.0
TOTAL	**100.0**

RSCO-URB-INAC-166-309-002-80

Contenido neto: 12 g

Tóxico en caso de ingestión

No. de Lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro, importador y distribuidor: Bayer de México, S.A. de C.V.
Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada. C.P. 11520, México, D.F.
Servicio al Cliente 01 800 229 3727 www.saludambiental.com.mx
Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México. C.P. 55540

“HECHO EN ESPAÑA”

® Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

PELIGRO

MUESTRA

recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.”

- “Este producto es extremadamente tóxico para animales (gansos, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas sexuales)”.
- “Este producto es altamente tóxico para animales terrestres (aves y mamíferos)”.
- “Este producto es altamente tóxico para abejas. No aplique cuando el cultivo o las malezas estén en flor y cuando las abejas se encuentren libando”.

“CAPANTTA”
Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad inherente de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de su utilización de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, **consulte a distribuidor Bayer de su localidad**.

“INSTRUCCIONES DE USO”
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!
INFORMACIÓN GENERAL
Ficam®W es un insecticida de grupo de los carbamatos, posee buen efecto knock y residual, que actúa por contacto e ingestión sobre de insectos y arácnidos aquí indicados. Aquítese con cualquier aspersor convencional. Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio y en buen estado.

Nombre común	Nombre científico	Dosis
MOSCAS	*Musca domestica*, *Fannia* spp. *Stomoxys calcitrans*	**Diluir 12 g de Ficam® W en 5 L de agua**
MOSQUITOS	*Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Culex* spp.	
CUCARACHAS	*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*	
HORMIGAS	*Lasius niger*, *Solenopsis* spp., *Monomorium pharaonis*	
CHINCHES	*Cimex lectularius*	
PULGAS	*Pulex irritans*, *Ctenocephalides canis*, *C. felis*	
GRILLOS	*Acheta domesticus*	
ALACRANES	*Centruroides* spp., *Vejovis* spp.	
	Loxosceles laeta	**Diluir 24 g de Ficam® W en 5 L de agua**

Preparación de la mezcla y método de aplicación
Determine la superficie del área a tratar para calcular la cantidad de mezcla a preparar. **Ficam®W** se puede aplicar con cualquier aspersor convencional.

Llenar la mitad del tanque de aspersión con agua. Iniciar la agitación y agregar la dosis indicada de **Ficam®W** al tanque. Continuar con la agitación y adicionar la cantidad restante de agua para lograr la concentración deseada. Mantener la mezcla en constante agitación durante la aplicación y evitar que la agitación y cavitación del tratamiento, se deberá preparar nuevamente la mezcla.

Ficam®W debe mezclarse con agua segun la dosis señalada, aplíquese bien hasta lograr una suspension homogenea. **Ficam®W** deberá aplicarse en lugares frescos y secos, en días nublados o por las mañanas y antes de las 08 horas.

Frecuencia de aplicación: el intervalo de aplicación depende del grado de infestación, se recomienda una aplicación cada 30 a 60 días.
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: se deberá esperar 30 minutos posteriores tras la aplicación.

Contraindicaciones: No aplicar en contra del viento.

Rendimiento: la mezcla preparada rinde para 100 m² de superficie en tanda o directamente en grietas y rendijas.

Determine la superficie a aplicar. Para calcular el número de bolsas de **Ficam®W** necesarias para el área a tratar, divida los metros cuadrados a tratar entre 50 y el resultado será el número de bolsas de **Ficam®W** que necesita.

Para aplicaciones en grietas y rendijas, aplique **Ficam®W** con un espolvoreador manual, hasta que el polvo penetre en las grietas y rendijas.

Para aplicaciones en superficies, aplique **Ficam®W** con un espolvoreador manual, distribuyendo uniformemente el producto.

Para aplicaciones en espacios abiertos, aplique **Ficam®W** con un espolvoreador manual, distribuyendo uniformemente el producto.

Limpieza del equipo de aplicación
Después de cada aplicación, lave el equipo de aplicación con abundante agua limpia y jabón. Enjuague perfectamente el equipo de aplicación.

Disposición final de envases y residuos
Para envases de plástico rígido: Una vez que el envase ha sido vaciado completamente, realice el triple lavado de la siguiente manera:

1. Vacíe el contenido del envase en el equipo de aplicación y mantenga en posición de derrame durante 30 segundos.
2. Llene el envase con agua limpia hasta una cuarta parte de su capacidad.
3. Tape el envase y agite vigorosamente durante 30 segundos.
4. Vacíe el agua de lavado en el equipo de aplicación y mantenga en posición de derrame durante 30 segundos.
5. Repita la operación dos veces más.

Inutilice el envase perforando el fondo del mismo y entregue en el centro de acopio autorizado más cercano.

Para envases flexibles: Una vez que el envase ha sido vaciado completamente, realice el triple lavado de la siguiente manera:

1. Vacíe el contenido del envase en el equipo de aplicación y mantenga en posición de derrame durante 30 segundos.
2. Llene el envase con agua limpia hasta una cuarta parte de su capacidad.
3. Cierre el envase y agite vigorosamente durante 30 segundos.
4. Vacíe el agua de lavado en el equipo de aplicación y mantenga en posición de derrame durante 30 segundos.
5. Repita la operación dos veces más.

Inutilice el envase perforando el fondo del mismo y entregue en el centro de acopio autorizado más cercano.

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo y aplicación de **Ficam®W** se deberá utilizar ropa protectora: Overol, guantes resistentes a químicos, botas, antes de seguridad con protección lateral y ascensha para partículas finas.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE EL ALIMENTOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTENGASE EJENA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MLHERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.
- “LOS GUANTES DE PVC DEBERÁN ESTAR LIBRES DE PRODUCTO”.
- “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES. USE UN TRAJE DE MADERA O OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIRA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

Mantengase el paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación aleje al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y mantengalo en reposo. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavar profusamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Intoxicación crónica: **Signos y síntomas de Hoxicación Contacto con la piel:** causa irritación cutánea, dermatitis, en la piel, por contacto con los ojos causa irritación por inhalación causa irritación de las membranas mucosas. Los signos y síntomas por intoxicación cefalea, visión borrosa, nausea, vomito, dolor abdominal, diarrea, sudoración profusa, salivación, disnea, espasmos musculares y ataxia. **Tratamiento:** Lavado de estomago y lavado gastrico, previa aspiración del contenido gastrico y vuelva a aplicar el carbon activado. Administrese frecuentemente sin embargo la administración posterior de carbón activado. Administrese frecuentemente sin embargo la administración de carbón activado. Administrese frecuentemente sin embargo la administración de carbón activado. Administrese frecuentemente sin embargo la administración