

## “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

**Maxforce®** es un cebo específico para cucarachas. Durante el manejo y aplicación de **Maxforce®** deberá utilizar guantes protectores.

### MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD

En caso de exposición crónica al producto o ingestión de grandes cantidades, pueden presentarse síntomas tales como fatiga, debilidad muscular, disturbios respiratorios y hasta calambres musculares. En caso de contacto con los ojos y/o la piel se puede presentar ligera irritación en personas sensibles.

**“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”, “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.**

**“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE”, “EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”**

Guardar y transportar **Maxforce®** en su empaque original debidamente cerrado.

**“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”**

**“PRIMEROS AUXILIOS”**

**Maxforce®** es del grupo químico de los cloronicotinilos. **Signos y síntomas de intoxicación:** en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. **Tratamiento:** sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración de carbón activado así como laxantes salinos. **Antídoto:** no existe antídoto específico.

**“ALEJE A LAS PERSONAS DEL AREA” “EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LÁVESE CON ABUNDANTE AGUA”.**

**“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.**

**FORMA ADECUADA DE USO Maxforce®** es un cebo específico para eliminar cucarachas en todos aquellos lugares donde se observa su actividad y por donde circulan y pasan las cucarachas. Posee amplio margen de seguridad para su familia y animales domésticos. Nunca aplique otros insecticidas sobre el producto. El efecto de **Maxforce®** puede durar hasta 12 semanas, siempre y cuando se encuentre presente el cebo. Se deberán renovar los puntos de aplicación tanto como sea necesario hasta que desaparezca la infestación. Recuerde que **Maxforce®** tiene que ser consumido por las cucarachas. También se aplica utilizar como tratamiento preventivo en áreas libres de cucarachas para evitar posibles infestaciones.

**“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS” “USO DOMÉSTICO”**



# Maxforce®

**INSECTICIDA, cebo cucarachicida en gel**

### “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

#### Ingrediente activo:

Imidacloprid: (E)-1-(6-Cloro-3-Piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina: 2.15  
(Equivalente a 21.5 g de i.a./Kg)

#### Ingredientes inertes:

Cebos, amortiguadores, espesantes, emulsificantes, anticongelante, conservadores, dispersante, amargante, antiespumante, solventes, humectante. 97.85  
TOTAL 100.00

RSCO-INAC-0199-0482-382-2.15

Contenido neto: 48 X 30 g

**Puede ser nocivo en caso de ingestión**  
**Puede ser nocivo por el contacto con la piel**

No de Lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)  
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V.

Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatlilla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México.  
C.P. 55540 Tel. 01 (55) 57 28 30 00

Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V.

Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F.  
Servicio a clientes Lada sin costo 01-800-229-37-27  
www.saludambiental.com.mx

© Marca Registrada por Bayer Group

RFC: BME820511SU5

“HECHO EN FRANCIA”



## MODO DE EMPLEO

- Inspeccione y limpie el área a tratar, para eliminar los factores que favorecen la presencia de cucarachas: basura y alimento principalmente.
- Presione la tapa de la jeringa hacia abajo y jale de ella, posteriormente aplique el producto presionando suavemente el émbolo de la jeringa. Al finalizar la aplicación, vuelva a colocar la tapa.
- Aplique una gota de producto por cada metro a lo largo del recorrido de las cucarachas o una gota por m<sup>2</sup> de área a tratar. Ejemplo: en una cocina de 10 m<sup>2</sup>, aplicar 10 gotas de producto distribuidas en lugares estratégicos de la cocina, como pueden ser: grietas y esquinas de paredes, marcos de ventanas, rincones; cerca de grietas y hendiduras; debajo de muebles, tarjas y botes de basura; detrás de cajones; en los espacios huecos de cocinas integrales y/o modulares (Ver diagrama en interior del empaque). La mayor actividad del producto se logra cuando la aplicación se realiza a lo largo del trayecto de las cucarachas. En caso de una gran infestación, se deberá aplicar un mayor número de gotas, logrando así una mayor disposición del producto para las cucarachas.

**GARANTÍA:** Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto.

**Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.**

Bayer®



1 75 01051 10856 6



# PRECAUCIÓN