

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Evite su ingestión, inhalación y el contacto con los ojos, piel y mucosas. Utilícese equipo de protección adecuado para su aplicación: overol, botas y guantes de hule, evítese comer, beber o fumar durante su aplicación, lávese las manos después de aplicar el producto.

"ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA"

"NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"NO SE REUTILICE ESTE ENVASE"

"EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de sobre exposición "ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA" "EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LÁVESE CON ABUNDANTE AGUA". Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de exposición prolongada, retire a la persona del área contaminada, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbirole la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

ANTÍDOTO: Adminístrese vitamina K₁ como antídoto específico por vía oral, intramuscular o endovenosa, tal como se indica para tratar sobredosis de bishidroxycumarina. Repítase el tratamiento cuando sea necesario, basándose en la observación del tiempo de protombina. La dosis máxima de vitamina K₁ es de 40 mg. al día.

Recomendaciones al médico veterinario: los signos en los animales intoxicados son similares a los del humano, se recomienda administrar vitamina K₁ como antídoto a la dosis de 5 a 10 mg/kg durante 3 semanas.

"EN CASO DE MALESTAR POR SOBRE EXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

6222-5



"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"USO DOMÉSTICO"



RODENT CAKE™

Rodenticida / Bloque parafinado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:		
DIFACINONA:		g de i.a. / kg
(Equivalente a 0.05 g de i.a. / kg)		0.005 g de i.a. / kg
INGREDIENTES INERTES:		
Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado alimenticio, parafina, colorante azul.		99.995 g de i.a. / kg
TOTAL:		1 Kg

No. de Registro: RSCO-DOM-RODE-503-301-033-0.005

CONTENIDO NETO: 8.17 kg



**NOCIVO EN CASO DE INGESTION
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**

Importado y distribuido por:
**SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL
DE PLAGAS, S.A. DE C. V.**

Ámsterdam No. 143
Col. Hipódromo Condesa
06100 México, D.F.

Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8893
www.univaresmexico.com

Formulado Por:



3699 Kinnaman Blvd.
Madison, WI 53704 U.S.A.
www.bellabs.com

"Hecho En E.U.A."

"INSTRUCCIONES DE USO"

Determinese los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspecciónese las áreas tratadas al tercer día repóngase el cebo consumido. Manténgase una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones. Posteriormente repítase el tratamiento a intervalos semanales, hasta que descienda el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños para prevenir reinfestaciones establézcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación repítase el tratamiento.

Utilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	NO. DE BLOQUES POR PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
Rata Noruega Rata negra	LIGERA A MODERADA SEVERA	1 a 3 4 a 6	Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado o directo a madriguera cada 5 a 10 metros.
RATONES Ratón doméstico		1	Colóquese la cantidad de cebo indicada cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.

El uso de cebaderos herméticos de la línea Protecta® incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. Donde se repitan reinfestaciones continuas, colóquense cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea necesario. Inscríbese sobre los cebaderos la leyenda: PRECAUCIÓN RODENTICIDA. 021214/01-14

Lote No.:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Product Code: 4260



PRECAUCIÓN

