

“APLICACIÓN URBANA”
UNIVAR®

CONTRAC®
BLOX™ 10 GRS

Bromadiolona
Rodenticida / Bloque parafinado



PRECAUCIÓN

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES
DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR
LA SECRETARIA DE SALUD”

Bell
LABORATORIES, INC.
3699 Kirsman Blvd.
Madison, WI 53704 U.S.A.
www.belllabs.com

CONTENIDO NETO: 1.8 kg



Product Code: 65418

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (overol impermeable, guantes de PVC, goggles, mascarilla contra polvo o mascarilla completa con cartucho respiratorio). Mantenga el producto bien tapado en su empaque original. No use el producto en corrientes de agua.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APILQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Si ha habido contacto con la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, con supervisión médica siempre que sea posible, induzca al vómito introduciendo un dedo en la garganta administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia).

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo químico del producto: Hidroxicoumarinas.

Antídoto: Administrar vitamina K1.

Tratamiento específico.- Administrar vitamina K1. Dosis adultos: 40 mg/día en varias formas. Dosis niños: 20 mg/día en varias formas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protrombina y niveles de hemoglobina. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y queden normales, y la hemorragia haya cesado.

Signos y síntomas de intoxicación: Al ser ingerido por seres humanos puede provocar diarrea y hemorragia por nariz y encías.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY FERTILES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL: HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEJÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCAÑO".

"INSTRUCCIONES DE USO"

CONTRAC BLOX es un rodenticida de acción anticoagulante. Utilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	NO. DE BLOQUES / PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
Ratas	LIGERA A MODERADA	2 a 6	Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado o directo a madriguera cada 5 a 10 m.
Rata Noruega Rata negra	SEVERA	8 a 16	
RATONES Ratón doméstico		2	Colóquese la cantidad de cebo indicada cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Inmediata.

Frecuencia de aplicación: Repetir la aplicación en caso de reinstatación.

Métodos para preparar y aplicar el producto

Determinese los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles; en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

"GARANTÍA"

Inspecciones las áreas tratadas. Al tercer día repóngase el cebo consumido. Manténgase una dotación ininterumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones. Posteriormente replácese al tratamiento a intervalos semanales, hasta que descienda al consumo de cebo o se detecte la disminución de daños. Para prevenir reinstataciones, establezcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinstatación, replácese el tratamiento.

Lote No.:

El uso de cebaderos herméticos de la línea Protecta® incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. Donde se replan reinstataciones continuas, colóquense cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea necesario. Inscribáse sobre los cebaderos la leyenda: PRECAUCIÓN RODENTICIDA.

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación



Bromadiolona
Rodenticida / Bloque parafrinado
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"
INGREDIENTE ACTIVO:
Bromadiolona: 3-(3-(4-Bromo(1-Hetero(1,4)-hidrox)-2H-benzotriazol-2-ona)-1-fenil-propil)-4-hidroxi-2H-benzotriazol-2-ona
(Equivalente a 0.05 g de la Mg.)
% EN PESO
NO MENOS DE: 0.005%
NO MÁS DE: 99.995%
Total: 100.000%

INGREDIENTES INERTES:
Cereales grado alimento, azúcar, agente grado alimento, parafina, colorante azul.
NO MÁS DE:
Total:
CONTENIDO NETO: 1.8 kg

No. de Registro: RSCQ-URB-R00E-511-309-035-0.005
NOCTURNO EN CASO DE INTOXICACIÓN
NOCTURNO EN CASO DE INTOXICACIÓN
SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.

Villa Primavera No. 640
Int 3 Col. Villas de Lindavista
C.P. 64540 Monterrey, Nuevo León
Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8883
www.univaresmexico.com
Formulado Por: 989 Kiguna Blvd.
Mason, VA 22091, U.S.A.
Bell Laboratories, Inc. Hecho En E.U.A.

PRECAUCIÓN

