

RODENT CAKE

Etiqueta

"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"USO DOMÉSTICO"



RODENT CAKE

Rodenticida / Bloque para infestación

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

DE-ACONITINA 0.05 g de i.a. / kg

(EQUIVALENTE A 0.05 g de i.a. / kg)

INGREDIENTES INERTES:

Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado

alimenticio, parafina, colorante azul.

TOTAL:

98.995 g de i.a. / kg

1 Kg

Nº de Registro: RSCO-DOH-RODE-503-301-033-0.005

CONTENIDO NETO: 8.17 kg

NOCIVO EN CASO DE INGESTION

NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

Importado y distribuido por:

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL

DE PLAGAS, S.A. DE C. V.

Amsterdam No. 143

Col. Hipódromo Condessa

06100 México, D.F.

Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8893

www.univarsmexico.com

Formulado Por:

BELL

LABORATORIOS, INC.

3699 Kirsman Blvd.

Madison, WI 53704 U.S.A.

www.belllab.com

Hecho En E.U.A.

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Evite su ingestión, inhalación y el contacto con los ojos, piel y mucosas.

Utilícese equipo de protección adecuado para su aplicación: overol, botas y guantes de hule,

evítese comer, beber o fumar durante su aplicación, lávese las manos después de aplicar el

producto.

"ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE

"COCINA"

"NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"NO SE REUTILICE ESTE ENVASE"

"EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave,

alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben

conservarse en su envase original bien cerrado.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS,

ROPA O JUGUETES"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de sobre exposición "ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA" "EN CASO DE

CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LÁVESE CON ABUNDANTE AGUA". Si ha ingerido el

producto y la persona está consciente, provoque el vómito. Si la persona está inconsciente,

asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir

absolutamente nada en la boca. En caso de exposición prolongada, retire a la persona del

área contaminada, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y

mantiégala abrigada y en reposo.

ANTIDOTO: Adminístrese vitamina K₁ como antídoto específico por vía oral, intramuscular o

endovenosa, tal como se indica para tratar sobredosis de bishidroximarina. Repítase el

tratamiento cuando sea necesario, basándose en la observación del tiempo de protombina.

La dosis máxima de vitamina K₁ es de 40 mg. al día.

Recomendaciones al médico veterinario: los signos en los animales intoxicados son

similares a los del humano, se recomienda administrar vitamina K₁ como antídoto a la dosis

de 5 a 10 mg/kg durante 3 semanas.

"EN CASO DE MALESTAR POR SOBRE EXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL

MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

8022-5

"INSTRUCCIONES DE USO"

Determinese los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde

encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las madrigueras,

agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, en el

perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido

observados con frecuencia.

Inspeccionese las áreas tratadas al tercer día repóngase el cebo consumido. Manténgase

una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan

los signos de actividad de las ratas o ratones.

Posteriormente repítase el tratamiento a intervalos

semanales, hasta que disminuya el consumo de cebos o se

detecte la disminución de daños para prevenir

reinfestaciones estabílezcanse tratamientos de

mantenimiento. Si ocurre una reinfestación repítase el

tratamiento.

Utilícese para el control de roedores como la rata común o

de alcantarillas (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus*

musculus) de la siguiente forma:

0 30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7

30835 40169 7