

DIFARAT

Etiqueta

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**
- Use equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (Difarrat completo, botas de seguridad, guantes de látex, nitrilo o vinilo).
- PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**
- NO MANEJE EL PRODUCTO SIN LA ETIQUETA DE MANEJO DEL PRODUCTO.
 - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BODOS O FORRAJES.
 - MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.
 - LAVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
 - NO MANIPULE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO.
 - NO ALMACENE EN CASA HABITACION.
 - MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
 - AL FINAL DE LA MANEJA Y ENTREGA DEL PRODUCTO, LAVASE LAS MANOS CON AGUA Y JABON.
 - NO SE MANIPULE CERCA DEL FUEGO.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Si el producto ha hecho contacto con la piel y ojos, lívese la parte afectada con agua limpia y corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto, promueva el vómito y beba agua limpia y corriente. Si la toxina está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad y no provoque el vómito, tampoco trate de introducir nada vía oral. llame inmediatamente a un médico

RECOMENDACIONES AL MEDICO

- Grupo químico. Anticoagulante del grupo de las indandionas, síntomas de intoxicación: la ingestión del producto puede causar dolor epigástrico, náusea, vómito, palpitaciones, cianosis, vértigo y días después hemorragias internas. Por rebatción puede causar irritación de vías respiratorias y/o hemorragia nasal. Puede absorberse por piel y causar enrojecimiento, prurito y neurálgia. En los ojos puede causar irritación temporal.
- Antídoto y tratamiento específico: El tratamiento debe ser sintomático administrando este producto vía oral en dosis de 15 a 25 mg para adultos y para infantes de 5 a 10 mg este producto también puede administrarse vía intramuscular 5 a 10 mg en adultos y 5 mg en infantes. Repitiendo si es necesario. Debe mantenerse bajo supervisión médica al paciente hasta que los niveles de protrombina sean normales y las hemorragias hayan cesado, la transfusión sanguínea es recomendable según el hematocrito del paciente.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DEL SUELO, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PISAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS
- EVITE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y EN LOS ANIMALES QUE LO ESTABLECIDO EN LA ETIQUETA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SU REGISTRO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARINAT
- EN CASO DE CADA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMAS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.

CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA

- Este producto es ALTAMENTE tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).
- **GARANTIA:** AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. garantiza la composición química del producto y sus resultados, siempre y cuando se emplee bajo condiciones normales y manejo del producto indicado en la etiqueta. Así mismo declina toda responsabilidad por daños que pudieran resultar del uso del almacenamiento o manejo inapropiado del producto o de sus envases por parte del cliente.

"APLICACIÓN URBANA"
"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



difacinona

Rodenticida anticoagulante del grupo de las indandionas en formulación de extrudados esféricos
• Mata ratas y ratones • Irresistible sabor para los roedores
• Forma y diseño del extrudado especializado

Contenido Porcentaje:	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Difacinona: 2-diflindacetil 1.3 Indandiona	0.005 %
INGREDIENTES INERTES:	
Bases, saborizante, edulcorante, colorante y vehículo	99.995 %
TOTAL	100.000 %

Registro: RSCO-URB-RODE-503-311-033-0.005

Contenido neto:

8 kg



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

Fecha de fabricación:
Fecha de Caducidad: 2 años después
de su fabricación

DISTRIBUIDOR POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Huixtla, Oaxaca
Teléfono comercial: (55) 9183-2400, Veritas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407 Fax: (55) 9183-2420.
Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx www.tridente.com.mx

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICACIONES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD

INSTRUCCIONES DE USO

DIFARAT es un rodenticida anticoagulante de primera generación, elimina ratas, ratones y otras especies de roedores presentes en el ambiente urbano.

Plagas	Tipo de infestación	Cantidad de extrudados parafrinados por punto de cebado	Observaciones
Ratas Rattus norvegicus Rattus rattus	Ligera a moderada alta	5 a 10 bloques	Colocar los cebos dentro de la madriguera o en el área frecuentada por las ratas dentro de las estaciones cebadero
Ratones Mus musculus	Alta	10 a 20 bloques	
	Ligera a alta	5 a 10 bloques	Coloque los cebos dentro de las madrigueras o en el área frecuentada por los ratones dentro de las estaciones cebadero

APLICACION:

DIFARAT Este producto consiste en extrudados parafrinados esféricos; está indicado para el control de roedores en cordones primarios y secundarios, en zonas industriales, áreas especializadas en industria alimentaria, construcciones urbanas y sus alrededores. Localice los sitios de alimentación, tránsito y reposo de los roedores, coloque DIFARAT en estos lugares o en la entrada de madrigueras. Para prevenir la reinfestación, limite las fuentes de alimento y agua para los roedores, tanto como sea posible. Si la reinfestación ocurre, repita el tratamiento. Donde haya una fuente continua de infestación, ubique cebaderos permanentes y rellene cuanto sea necesario. Maneje el producto con guantes, colecte y elimine apropiadamente todos los animales muertos así como el cebo sobrante.

CONTRAINDICACIONES

No se mezcle con el uso de insecticidas y no se almacene cerca de los mismos.



PRECAUCIÓN